

# 精品国产一区二区av亚洲V.3.5.2学术在线网

亚洲精品国产av一区二区 | 2026-04-11

亚洲精品国产av一区二区是当前备受关注的热门话题。本文将围绕亚洲精品国产av一区二区展开详细介绍，帮助读者全面了解相关内容。

## 亚洲精品国产av一区二区概述

2022年5月，英國發現多個猴痘病例，證實猴痘疫情持續蔓延。第一例確診發生在5月6日，該人士曾到訪尼日利亞（猴痘流行地區）。從5月18日起，越來越多的國家和地區報告了病例，主要是在歐洲國家，疫情亦出現於北美洲和南美洲、亞洲、非洲和澳大利亞。截至2023年3月19日（2023-03-19），已有113個國家和地區被此次疫情波及、並報告了86,000多例猴痘确诊病例和280例死亡病例，2022年7月23日，世界衛生組織宣布2022年猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。2023年5月11日，世界衛生組織宣布猴痘疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件。這次疫情標誌著該疾病首次在中非和西非以外地區廣泛傳播。衛生部門強調，任何人都可能感染這種疾病，尤其是當他們與有症狀的人有密切接觸。世衛組織的初步評估指出，預計疫情將得到控制，對受影響國家的普通民眾的影響較小。但該組織於七月一日的一份聲明承認，未監測到的傳播已經發生了一段時間，並呼籲採取緊急行動遏制傳播。猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病。感染猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷和疲倦，其後身上出現類似水泡的皮疹並癒合。症狀持續時間通常為2至4週。在此次疫情前的猴痘感染中，已有1%至3%的感染者死亡（未經治療）；兒童病例較有可能出現重症。

猴痘是一種由病毒引起的人畜共通傳染病，即病原體從動物傳播給人類。感染猴痘的早期症狀包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷和疲倦，其後身上出現類似水泡的皮疹並癒合；有些患者會先出現皮疹，或者只出現皮疹。潛伏期通常為7至14天，但也可能為5至21天；症狀持續時間通常為2至4週。在記錄的病例中，死亡患者比例在0至11%之間，幼兒死亡比例更高。絕大多數患者能康復。猴痘由猴痘病毒引起，該病毒與天花病毒同屬正痘病毒屬。據信，該病毒通常會在非洲的某些啮齒類動物中傳播。已感染人類的猴痘病毒分為西非分支和剛果盆地分支兩種，後者也被稱為中非分支；其中西非類型引發的病症比中非（剛果盆地）類型的更輕。猴痘引起的疾病症狀與天花相似，但沒有天花那麼嚴重。診斷方式為檢測病變部位的病毒DNA。此次爆發的西非分支致死率較低，約1%。

2022年5月7日，英國國際衛生條例國家聯絡點向國際衛生組織報告了一起猴痘确诊病例。該患者自4月下旬由英國前往猴痘流行地區尼日利亞旅行，期間在拉各斯和三角洲州停留。患者在4月29日，仍然位於尼日利亞時出現皮疹症狀，隨後於5月3日離開尼日利亞，於5月4日到達英國，同日於醫院就診。基於旅行史和症狀，該患者被懷疑患有初期症狀的猴痘，被蓋伊醫院收入住院並立刻被隔離。實驗室於5月6日通過對水泡拭子進行逆轉錄聚合酶鏈式反應確認患者感染了猴痘的西非演化支，這是猴痘已知的兩種變種中致死率較低的一種，致死率約為1%。對指示病例所乘坐的國際航班上以及抵達英國境內後與指示病例有接觸的人進行了廣泛的接觸者追蹤，對潛在接觸者建議保持對猴痘症狀的了解，並在接觸後21天內如果出現症狀立刻進行隔離。由於對接觸者進行追蹤，世界衛生組織（WHO）認為該病毒在英國境內進一步傳播的風險“處於最小”。5月14日，據蘇格蘭公共衛生署，對接觸者的追蹤已經擴展到蘇格蘭。蘇格蘭的“少數”人在和最初病例發生密切接觸後被命令自我隔離，不過對普通公眾的總體風險仍然“非常低”。5月12日，英國衛生安全署確認了2例新的猴痘病例，均位於倫敦。兩名患者在一起共同生活，然而，任何一人都與指示病例或前往流行地區旅行沒有已知的聯繫。一名患者在聖瑪麗醫院住院，而症狀較輕的另一名患者正在家中自我隔離。5月17日，英國衛生安全署報告了4起新猴痘病例，3名患者位於倫敦，另一名患者位於東北英格蘭，此前曾前往倫敦。任何一名新患者都沒有任何與前3名确诊病例的已知接觸史，表明倫敦地區可

能正在发生更广泛的社区传播。然而，英国卫生安全署称，对普通公众的风险仍然“非常低”。已确认患有猴痘的患者正在位于泰恩河畔纽卡斯尔的皇家维多利亚医院和伦敦的皇家自由医院、盖伊医院住院。5月20日，据贾伟德，英国又确诊11例病例，使病例总数达到20例。7月，英国一项最新研究显示，英国此轮猴痘疫情患者的症状与以往猴痘流行国家患者的症状不同，发烧症状的比例相对较低、皮疹范围较小、症状更加轻微。

## 亚洲精品国产av一区二区的背景与发展

数学（英语：mathematics；源自古希腊语μάθημα，*máthēma*；缩写为math或maths），是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科。

数学是人类对事物的抽象结构与模式进行严格描述、推导的一种通用手段，可以应用于现实世界的任何问题，所有的数学对象本质上都是人为定义的。从这个意义上，数学属于形式科学，而不是自然科学。

不同的数学家和哲学家对数学的确切范围和定义有一系列的看法。在人类历史发展和社会生活中，数学发挥着不可替代的作用，同时也是学习和研究现代科学技术必不可少的基本工具。

## 深入分析

硒（xī）（英語：Selenium），是一種化學元素，化學符號為Se，原子序數為34，原子量為78.971 u。硒是一種非金屬（偶爾被認為是類金屬），具有的性質介於元素週期表中上下兩元素硫和碲之間，且與碲也有相似性。它罕以元素狀態存在，亦甚少在地殼中以純化合物的礦石存在。Selenium（來自古希臘語σελήνη（selénē）“月神名”）於1817年由永斯·貝吉里斯發現，他注意到此新元素與先前發現的碲（以地球命名）具有相似性質。硒存在於金屬硫化物礦物中，礦石中金屬應與硫原子鍵結的位置，部分由硒原子取代。在商業上，硒經常是得自這些礦石的精煉過程中所產生的副產物。純的硒化物或硒酸鹽化合物礦物是已知的，但很少見。現今硒的主要商業用途是在玻璃製造和色素。硒是一種半導體，用於光電池，曾經是很重要的電子學應用，現已大部分被矽半導體的裝置取代，但硒仍用於少數幾種類型的直流電源突波保護器和一種螢光量子點。服用大量硒鹽可能引起中毒，但微量的硒是許多生物（包括所有動物）細胞功能所必需的。硒是許多多種維生素和其他膳食補充劑中的一個成分，包括嬰兒配方奶粉。它是抗氧化酶谷胱甘肽过氧化酶和硫氧還蛋白還原酶的組成成分（間接還原動物和一些植物中的某些氧化分子）。它也存在於三種脫碘酶中，它們將一種甲狀腺激素轉化為另一種。植物中硒的需求因物種而異，某些植物需要相對較大的量，而另一些則顯然不需要。

硒有七種天然存在的同位素。其中五個：74Se、76Se、77Se、78Se和80Se是穩定的，而80Se是其中含量最豐富的（天然豐度為49.6%）。其他天然存在的同位素還包括長壽命的原始放射性核種 82Se，其半衰期為9.2×10<sup>19</sup>年。具放射性的非原始核種硒-79也以微量存在於鈾礦石中，是核分裂的產物。硒還有許多不穩定的放射性人造同位素，質量數介乎64Se到95Se；其中最穩定的兩種是75Se，半衰期為119.78天，和72Se，半衰期為8.4天。硒的同位素中，比穩定同位素更輕的放射性同位素主要透過正電子發射生成碲的同位素，而比穩定同位素更重的放射性同位素則進行β衰變生成溴的同位素，在已知最重的硒同位素中，會有少數進行中子發射的支線。

$3 \text{ Se} + 4 \text{ HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3 \text{ H}_2\text{SeO}_3 + 4 \text{ NO}$  不像形成穩定三氧化物的硫，三氧化硒在热力学上不稳定，超过185 °C时分解成二氧化硒：

## 相关内容介绍

$2 \text{ SeO}_3 \rightarrow 2 \text{ SeO}_2 + \text{O}_2$  ( $\Delta H = -54 \text{ kJ/mol}$ ) 在实验室里，三氧化硒可以由无水硒酸钾 (K<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>) 和三氧化硫 (SO<sub>3</sub>) 反应而成。亚硒酸的盐叫做亚硒酸盐，例子包括亚硒酸银 (Ag<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub>) 和亚硒酸钠 (Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub>)。硫化氢会和亚硒酸反应，生成二硫化硒：

$\text{H}_2\text{SeO}_3 + 2 \text{ H}_2\text{S} \rightarrow \text{SeS}_2 + 3 \text{ H}_2\text{O}$  二硫化硒由八元环组成，组成约为 SeS<sub>2</sub>，其中的八元环的成分可变，例如

Se<sub>4</sub>S<sub>4</sub>和Se<sub>2</sub>S<sub>6</sub>。二硫化硒已在洗发水中用作抗头皮屑剂、聚合抑制剂、玻璃染料和烟花中的还原剂。三氧化硒可以由硒酸 H<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>脱水而成，而后者可以由二氧化硒和过氧化氢反应而成：

$Se_8 + 24 F_2 \rightarrow 8 SeF_6$  相较于对应的硫化合物六氟化硫，六氟化硒 (SeF<sub>6</sub>) 更活泼，有毒，会刺激肺部。一些硒的卤氧化物如：二氟氧化硒 (SeOF<sub>2</sub>) 和二氯氧化硒 (SeOCl<sub>2</sub>) 都用于特殊溶剂。

## 详细信息

硒，特别是II氧化态的硒能与碳形成稳定的键，其结构类似于相应的有机硫化合物。硒和硫有类似的性质，因此，许多有机硫化合物都有对应的有机硒化合物。其中，最常见的是硒醚 (R<sub>2</sub>Se，硫醚的类似物)、二硒化物 (R<sub>2</sub>Se<sub>2</sub>，二硫化物的类似物) 和硒醇 (RSeH，硫醇的类似物)。有机硫化学中的亚砷在有机硒化学中对应的化合物是硒代亚砷

(RSe(O)R)，是有机合成的中间体，例如硒代亚砷消除反应。由于双键规则，硒酮 R(C=Se)R和硒醛 R(C=Se)H都很罕见。

硒是人體必需的微量礦物質營養素，多以氧化態Se(II)、Se(IV)、和Se(VI)存在，化學性質與硫相似，許多含硫胺基酸，如甲硫胺酸 (Met)、半胱胺酸 (Cys)、胱胺酸也可用硒取代硫。

硒在動物組織中最常以硒甲硫胺酸 (selenomethionine，簡稱SeMet) 和硒半胱胺酸 (selenocysteine，簡稱SeCys) 的形態存在，其中硒甲硫胺酸無法由人體合成，僅能由植物合成後經攝食再經消化代謝而獲得，故食材動植物來源組成將決定硒在飲食中的形式，此外，人體中硒甲硫胺酸可以取代甲硫胺酸；但硒半胱胺酸不能取代半胱胺酸。硒在生理上的功能除了抗氧化外，還調控了甲狀腺的代謝和維他命C的氧化還原態，也曾被提出和抗癌相關的可能性。在食材成分含量裡，同種植物性食材含硒成分變化相當大，乃因各原植物生長地的土壤中硒的濃度不同，當地的動物也隨之反映相應情形，因此硒營養缺乏或過量情形常有地域性關係。然而，純硒元素和金屬硒化物的毒性相對上不大，而且有些為重要的微量元素之一。嚴重缺乏可引致克山症和溪山症，病徵包括心肌壞死、萎縮、軟骨組織壞死。另外又與甲狀腺腫、呆小症和習慣性流產有關。

以上就是关于亚洲精品国产av一区二区的详细介绍。亚洲精品国产av一区二区等相关话题也值得进一步了解。