

# clion解决方法乱码中文输出V.9.8.1.2学术门户网

clion中文输出乱码解决方法 | 2026-04-12

clion中文输出乱码解决方法是当前备受关注的热门话题。本文将围绕clion中文输出乱码解决方法展开详细介绍，帮助读者全面了解相关内容。

## clion中文输出乱码解决方法概述

考古天文学是天文学史领域中新兴发展起来的一个分支，它使用考古学的手段和天文学的方法来研究古代人类文明的各种遗址和遗物，从中探索有关古代天文学方面的内容及其发展状况。考古天文学使用各种方法来揭示过去实践的證據，包括考古学、人类学、天文学、统计学、机率及历史学。由於這些方法多種多樣，並且使用來自不同來源的數據，如何整合成連貫的論點一直是考古天文學家面臨的長期難題。考古天文学填补了景观考古学和认知考古学之间的互补空白。物质證據及其与天空的連結可以揭示更广阔的景观如何融入关于自然循环的信仰中，例如玛雅天文学及农业的关系。其他将认知和景观的概念结合在一起的例子包括定居点道路中嵌入的宇宙秩序的研究。考古天文学可以应用于所有文化和所有时期。天空的意义因文化而异；儘管如此，在考察古代信仰时，还是有一些科学方法可以跨文化应用。也许是因为需要在考古天文学的社会和科学层面之间取得平衡，克莱夫·拉格尔斯 (Clive Ruggles) 将考古天文学描述为「一个一方面是高质量的学术成果，另一方面是近乎疯狂、不受控制的猜测」。

尤安·麦基 (Euan MacKie) 支持汤姆的分析，他透过比较新石器时代的英国与玛雅文明，加上考古背景以论证这段时期存在著分層社會。为了验证他的想法，他在蘇格蘭擬建的史前天文台进行了几次挖掘。金特拉 (Kintraw) 因四米高的巨石而闻名，汤姆认为这是对侏罗山贝因·夏奈德 (Beinn Shianaidh) 和贝因·奥乔利亚斯 (Beinn o'Chaolias) 之间遥远地平线上某个点的预见。汤姆认为，这是地平线上的一个缺口，在隆冬时节，这里会出现双重日落。然而从地面上看来，日落会被山脊遮挡，观看者需要抬高两公尺：需要另一个观景台。科学家在峡谷对面发现一个由小石头形成的平台。文物的缺乏引起了一些考古学家的担忧，而且岩层分析也尚无定论，但在梅斯豪遗址和布什巴罗菱形遗址进一步研究使麦基得出结论，虽然“科学”一词可能不合时宜，但汤姆在高精度比对方面大体正确。相比之下，克莱夫·拉格斯 (Clive Ruggles) 认为汤姆的调查在数据选择上有问题。其他人则指出，地平线天文学的准确性受到地平线附近折射变化的限制。一些人更批评绿色考古天文学虽然可以回答过去人们是否可能对天文学感兴趣，但缺乏社会元素，这意味着绿色考古天文学很难回答人们为什么会感兴趣，使得绿色考古天文学对那些询问过去社会问题的人来说用处有限。凯瑟·金蒂 (Keith Kintigh) 写道：「坦白说，在许多情况下，某个特定的考古天文学主张是对是错，对人类学的进步来说并不重要，因为这些资讯并不能为当前的解释问题提供参考。」尽管如此，研究星图排列仍然是考古天文学研究的主要内容，尤其是在欧洲。

内布拉星象盘據稱是青銅時代描繪宇宙的文物的，其分析將類似於考古學其他子學科中使用的典型的發掘後分析。對一件文物進行檢查，並嘗試將其與民族歷史或人種學記錄進行類比。找到的相似之處越多，解釋就越有可能被考古學家接受。一個更平凡的例子是，羅馬帝國鞋子和涼鞋上發現了占星符號。鞋子和涼鞋的用途眾所周知，但卡羅爾·范德里爾·默里 (Carol van Driel-Murray) 提出，刻在涼鞋上的占星符號賦予了鞋子精神或醫療意義。透過引用其他已知的占星符號的用途及醫療實踐和當時的歷史記錄的聯繫，可以支持這一點。另一個具有天文用途的著名文物是安迪基西拉機械裝置。在這種情況下，對文物的分析以及西塞羅描述類似設備的參考將表明該設備的合理用途。光碟裝置上的符號使得光碟能夠被讀取，進一步支持了這個論點。

## clion中文输出乱码解决方法的背景与发展

桑普森（SAMPSON）多功能主动相位阵列雷达是英国BAE系统海事公司研制与生产的一种多功能双面有源电子扫描阵列雷达。它是“海毒蛇”海上防空系统的火控雷达。“海毒蛇”系统也被称为 PAAMS(S)，以表示使用了桑普森雷达，并将其与法国和意大利的地平线级护卫舰上的PAAMS系统区分开来。桑普森多功能雷达最远可探测 400千米（250 英里）外的空中和地面目标，并能同时跟踪数百个目标。“海毒蛇”利用这些信息来评估和指示目标的优先次序，并计算“紫苑”导弹的最佳发射时间。

传统雷达由旋转发射器和传感器组成，功率有限，易受敌方干扰，而且只能实现单一功能--因此需要独立的单元来监视、跟踪和瞄准。作为有源相控阵雷达，SAMPSON 使用软件来塑造和引导其雷达波束，使之能同时执行多项功能，并且通过自适应波形控制，几乎能无视敌方的干扰。有源相控阵比传统雷达具有更远的探测距离和更高的精度。波束引导软件通过复杂的算法来控制搜索，以最高的精度对数百个潜在目标的活动轨迹进行持续监控。SAMPSON 使用两个平面阵列来覆盖部分天空；通过旋转阵列可以提供360度的完整的覆盖，类似于传统雷达系统的运行方式。这与美国的AN/SPY-1（用于提康德罗加级导弹巡洋舰和 阿利·伯克级驱逐舰 Flight I-IIA）和AN/SPY-6（用于阿利·伯克级驱逐舰 Flight III）或荷兰APAR系统（用于荷兰皇家海军的七省级巡防舰、德国海军的萨克森级巡防舰和丹麦皇家海军的伊万·休特菲尔德级巡防舰）形成对比，它们使用固定的多个阵列来提供对整个天空的连续覆盖。尽管 SAMPSON 雷达无法提供持续的 360 度覆盖，但它以每分钟 30 转的速度旋转，并且由一对背靠背天线阵列，空中的任何部分都可以在平均不多于 0.5秒的时间内被覆盖到（由于波束也可以通过电子方式来回扫描，因此精确的时间会有所不同）。此外，由于使用天线阵列较少可使系统重量更轻，从而可以将天线阵列放置在显眼的桅杆顶部，而不是像荷兰或美国舰艇那样放置在舰桥上层建筑的侧面上。将雷达天线放置在更高的高度都可以扩大其视距，提高对低空或掠海目标的打击性能；SAMPSON 雷达天线高于水线的高度大约是外国海军同等舰船天线阵列的两倍。虽然 SAMPSON 在这方面性能的确切细节不太可能公开，但这些因素可能会减轻阵列数量较少的不利影响。然而，一些任务难以同时进行：例如，（长距离）空间搜索会消耗大量雷达资源，留给其他任务（如瞄准）的余地很小。将空间搜索与其他任务结合起来也会导致搜索速度缓慢或每项任务的总体质量低下等问题。雷达性能的驱动参数是对目标的照射时间或每个波束观测时间。因此，英国皇家海军选择了 S1850M 远程雷达来补充 45 型驱逐舰上的 SAMPSON 雷达。这也导致北约防空作战系统研究（NAAWS）将首选的防空作战系统定义为由互补的空间搜索雷达和 MFR 组成。这样做的另一个好处是，这两种系统可以使用两种不同的雷达频率；其中一种适合用于远程搜索，另一种适合用于 MFR（物理学原理使得这两种任务难以结合）。2006年2月1日下水的45型驱逐舰首舰勇敢号于2007年安装了 SAMPSON 和 S1850M 雷达，并于 2009 年 7 月 23 日服役。

圣日龙（法语：Saint-Girons，发音：[sɛ̃ ʒiʁɔ̃]），法国南部城市，奥克西塔尼大区阿列日省的一个市镇，同时也是该省的一个副省会，下辖圣日龙区，其市镇面积为19.13平方公里，2023年1月1日时人口数量为6,008人，是该省人口第三多的市镇，在法国市镇中排名第1,749位。圣日龙位于阿列日省西部，莱兹河与萨拉河交汇处，是一个区域性的中心城市，通常被认作是库斯朗地区的首府，多条公路在此交汇。

## 深入分析

圣日龙的早期历史尚不清楚。根据当地官方网站的论述，圣日龙始建于公元前70年，彼时该地出现了一处奥皮杜姆。公元5世纪时，与圣日龙相邻的圣利济耶成为天主教库斯朗教区的主教座。自公元12世纪以来，圣利济耶过剩的人口开始向上游的圣日龙迁徙，圣日龙人口数量逐年增加。法国大革命后，圣日龙成为阿列日省的一个市镇，并自1793年起成为该省的一个地区行署，后于1801年改制为副省会。1790至1794年间，莱达尔（Lédar）整体并入圣日龙。工业革命期间，布桑斯—圣日龙铁路和富瓦—圣日龙铁路相继建成通车，圣日龙及其所处的库斯朗地区出现造纸工业，圣日龙境内的莱达尔造纸工厂于1908年投产运营。1944年5月，藏匿于圣日龙的纳粹德军发动报复行动，造成该地15名平民遇难。1969年，圣日龙火车站停止客运服务，并于1991年彻底关闭。2008年9月，莱达尔工厂宣告破产。在地方历史文化研究方面，当地的地方史爱好者于1993年在圣日龙创建了“曾经的库斯朗”（Autrefois le Couserans）文化协会。

圣日龙位于法国南部，奥克西塔尼大区西南部和阿列日省西部，距离省会富瓦大约44公里。与圣日龙接壤的市镇包括：圣利济耶、库斯朗地区蒙茹瓦、穆利、昂库尔蒂耶克和埃谢伊。

圣日龙火车站已于1969年停止客运服务，并于1991年彻底关闭。 距离圣日龙最近的运营中的客运铁路车站为30公里外的圣马托里站，该站停靠往返于图卢兹和塔布之间的区域列车。

以上就是关于clion中文输出乱码解决方法的详细介绍。clion中文输出乱码解决方法等相关话题也值得进一步了解。